

Farmadex

Injetável

USO VETERINÁRIO

Solução Injetável

Solução injetável de dexametasona 2mg/mL de administração via intramuscular, endovenosa ou intra-articular.

FÓRMULA:

Cada 100 mL contém:

Dexametasona (fosfato de sódio) 200 mg

Veículo q. s. p. 100 mL

INDICAÇÃO:

Farmadex Injetável é anti-inflamatório indicado em todos os casos nos quais a inflamação mostra-se como sintoma agravante, indicado principalmente para o combate as inflamações que envolvem articulações. Artrites, bursites, sinusites e tendinites. No combate aos edemas por ferimentos, parto, cirurgias, etc., no combate a cetose bovina. Como coadjuvante no tratamento das mastites, metrites, febre vitular, doenças alérgicas, reumáticas, dermatológicas, pneumonias graves e outras doenças sensíveis aos corticoides.

POSOLOGIA E VIA DE ADMINISTRAÇÃO:

Farmadex injetável deve ser administrado por via intramuscular, endovenosa ou intra-articular.

USO PARENTERAL:

Bovinos e equinos: 10 a 30 mg de Dexametasona

Suínos, bezeros, potros, caprinos e ovinos: 2 a 5 mg de Dexametasona

Cães: 0,5 a 2 mg de Dexametasona

Gatos: 0,25 a 0,5 mg de Dexametasona

USO INTRA-ARTICULAR:

Bovinos, equinos e suínos adultos: 2 a 10 mg de Dexametasona

Pequenos animais: 0,25 a 5 mg de Dexametasona.

Equivalência: mL de Farmadex Injetável por mg de Dexametasona.

Farmadex Injetável mL	Dexametasona mg
0,25	0,5
0,50	1,00
0,75	1,5
1,00	2,00
1,25	2,5
2,50	5,00
5,00	10,00
10,00	20,00

Estas doses são diárias e deverão ser divididas. Cada caso poderá ter sua posologia alterada de acordo com a prescrição do Médico Veterinário.

RECOMENDAÇÕES:

Após o uso prolongado a retirada da droga deverá ser gradativa. O tratamento prolongado com corticosteroides eleva-se a incidência de efeitos colaterais. Uma única dose de Farmadex Injetável, mesmo alta, é virtualmente isenta de efeitos prejudiciais. A terapia corticoide nos quadros infecciosos combate apenas a inflamação podendo mascarar os sinais de infecção com consequente disseminação, sendo assim, torna-se obrigatório o estabelecimento concomitante de terapia antibacteriana apropriada. O uso de Farmadex Injetável deve ser evitado no último terço da gestação, pois pode provocar o aparecimento de sinais de parto ou desencadear o parto.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA:

BOVINOS - ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO 2 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

LEITE: O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO HUMANO ATÉ 2 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

SUÍNOS - ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO 2 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

"A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR PRESENÇA DE RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO".

PRECAUÇÕES:

Não aplicar durante prenhez avançada e em animais com insuficiência cardíaca.

MODO DE CONSERVAÇÃO:

O produto deve ser mantido na embalagem original até completa utilização, em temperatura ambiente (15°C a 30°C), ao abrigo da luz solar, umidade e calor.

MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

APRESENTAÇÃO:

Frasco-ampola com 10mL ou 50mL e display contendo 15 frascos-ampola de 10mL.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Dra. Vera de Fátima Costa Calixto – CRF/SP nº 11.427

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 6.006 em 18/06/1997.

PROPRIETÁRIO:

Syntec do Brasil Ltda.
Estrada Rosa Scarpa, 178 - Votupurim
Santana de Parnaíba/SP - CEP: 06513-010
CNPJ: 02.177.011/0001-77
INDÚSTRIA BRASILEIRA

FABRICANTE:

Jofadel Indústria Farmacêutica S/A
Av. Dr. José da Frota Vasconcelos, 100
Industrial JK - Varginha/MG
CEP: 37062-500
CNPJ: 17.843.582/0001-70
INDÚSTRIA BRASILEIRA