

# Flobiotic®

## Enrofloxacin Comprimidos

### Uso Oral

Uso Veterinário

#### Composição:

Cada comprimido contém:	<b>50 mg</b>	<b>150 mg</b>	<b>250 mg</b>
Enrofloxacin (base) .....	50 mg	150 mg	250 mg
Veículo q. s. p. ....	120 mg	360 mg	600 mg

#### MECANISMO DE AÇÃO:

**Flobiotic® comprimidos** é um produto composto por enrofloxacin, um antimicrobiano bactericida, do grupo das quinolonas de segunda geração. A sua atividade antimicrobiana está relacionada com a inibição da DNA Girase.

#### INDICAÇÕES:

**Flobiotic® comprimidos** é um antibiótico de uso oral a base de enrofloxacin, antimicrobiano pertencente ao grupo das fluorquinolonas. É indicado no tratamento de infecções causadas por *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Proteus mirabilis*, *Klebsiella pneumoniae*, *Enterobacter spp*, *Salmonella choleraesuis*, *Campylobacter jejuni*, *Bordetella bronchiseptica*, *Mycoplasma spp*, *Chlamydia spp*, *Streptococcus pyogenes*, *Pasteurella multocida* e *Enterococcus sp*, tais como, infecções genitourinárias, respiratórias e entéricas.

#### POSOLOGIA E MODO DE USAR:

Administrar **Flobiotic® comprimidos** via oral.

A dose recomendada para cães e gatos é 5mg/kg, cada 24 horas, durante 10 dias, ou a critério do Médico Veterinário, ou seja:

1 comprimido de 50 mg para cada 10 kg de peso vivo

1 comprimido de 150 mg para cada 30 kg de peso vivo

1 comprimido de 250 mg para cada 50 kg de peso vivo

O tratamento deve ser prolongado por período não inferior a 48 hora após o desaparecimento dos sintomas.

#### PRECAUÇÕES:

A administração conjunto a cátions di ou trivalentes, como produtos que contenham alumínio (ex: sucralfato), ferro ou cálcio, podem diminuir sua absorção.

Em gatos, não exceder a dose de 5 mg / kg / dia, altas doses podem ocasionar cegueira parcial ou completa e midríase temporária ou permanente.

#### CONTRAINDICAÇÕES:

Evitar o uso em animais jovens (cães: idade inferior a 8 meses porte médio ou inferior a 12 meses porte grande; e gatos: com idade inferior a 8 semanas) devido ao risco de lesão em cartilagem e em fêmeas prenhes.

#### MODO DE CONSERVAÇÃO:

Conservar à temperatura ambiente (15°C a 30°C), em local seco e ao abrigo da luz solar direta.

#### APRESENTAÇÃO:

Cartucho contendo 10 comprimidos de 120 mg, com 50 mg de Enrofloxacin base; Cartucho contendo 10 comprimidos de 360 mg, com 150 mg de Enrofloxacin base; Cartucho contendo 10 comprimidos de 600 mg, com 250 mg de Enrofloxacin base.

#### MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

#### VENDA SOB PRESCRIÇÃO E USO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob o nº 10.084 em 03/06/2015

#### RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Dra. Vera de Fátima Costa Calixto  
CRF/SP nº 11.427

#### PROPRIETÁRIO E FABRICANTE:

Syntec do Brasil Ltda.  
Estrada Rosa Scarpa, 178 - Votuparim  
Santana de Parnaíba/SP  
CEP: 06513-010  
CPNJ: 02.177.011/0001-77  
Indústria Brasileira