

Multitec[®]

USO VETERINÁRIO

Ação: Vermífugo oral de amplo espectro para cães.

Fórmula:

Cada comprimido contém:

	400mg	800mg	1200mg
Praziquantel	25,0mg	50,0mg	75,0mg
Pamoato de Pirantel	72,5 mg	145,0mg	217,5mg
Pamoato de Oxantel	190,0mg	380,0mg	570,0mg
Excipiente q.s.p.....	400,0mg	800,0mg	1200,0mg

Indicações: Multitec[®] é indicado no combate das formas adultas e larvais dos seguintes parasitas cestóides e nematódeos ancilostomídeos e ascarídeos dos cães: *Toxocara canis*, *Toxocara leonina*, *Ancylostoma caninum*, *Ancylostoma braziliense*, *Uncinaria stenocephala*, *Echinococcus granulosus*, *Echinococcus multilocularis*, *Dipylidium caninum*, *Taenia ovis*, *Taenia hydatigena*, *Taenia multiceps*, *Mesocestoides* spp, *Taenia pisiformis*, *Taenia taeniaeformis*, *Joyeuxiella pasqualei*, *Trichuris vulpis*. Possui ampla margem de segurança, não apresentando efeitos embriotóxicos ou teratogênicos, podendo ser utilizado por cães de todas as idades, incluindo lactentes, desmamados e gestantes.

Administração: Deve ser administrado por via oral em dose única. O comprimido deve ser misturado à ração ou à carne. O produto é bem tolerado, dispensando regime especial ou jejum prévio.

Posologia: As doses recomendadas para as diversas faixas de peso dos animais são:

PESO ANIMAL (kg)	DOSAGEM
Até 2,0 Kg	½ comprimido de 400 mg ou ¼ comprimido de 800 mg
De 2,0 a 5,0 Kg	1 comprimido de 400 mg ou ½ comprimido de 800 mg
De 5,0 a 10,0 Kg	2 comprimidos de 400 mg ou 1 comprimido de 800 mg
De 10,0 a 20,0 Kg	2 comprimidos de 800 mg ou 4 comprimidos de 400 mg
De 20,0 a 30,0 Kg	2 comprimidos de 1200 mg ou 3 comprimidos de 800 mg

Para cães acima de 30 kg, seguir a proporção acima.

Os comprimidos em todas as apresentações poderão ser conjugados e/ou fracionados, para tratamento com doses mais precisas. Qualquer alteração de posologia e modo de usar, bem como a frequência de tratamentos, ficam a critério do Médico Veterinário.

Calendário de Vermifugação Sugerido:

FILHOTES: Realizar vermifugações na 3ª, 6ª e 9ª semanas de vida.

CADELAS: Vermifugar na cobertura, uma semana antes do parto e 3 semanas após o parto, juntamente com a 1ª vermifugação dos filhotes.

CÃES ADULTOS: Vermifugar a cada 3 (três) ou 6 (seis) meses, conforme orientação do Médico Veterinário. Repetir após 15 dias.

Contraindicações: Não é recomendado para animais gravemente debilitados, já que sua ação farmacológica é mais pronunciada nesses hospedeiros, e nem deve ser administrado com outras drogas colinérgicas, como o levamisol, pois pode levar à potencialização da toxicidade.

Precauções: Para prevenir reinfestações por *Dipylidium caninum*, recomenda-se juntamente à administração do Multitec[®], um tratamento contra pulgas, pois estas são hospedeiros intermediários deste verme. Junto com a vermifugação deve ser feita uma limpeza rigorosa do ambiente com produtos à base de cloro ativo, efetivos contra larvas e ovos dos vermes.

Cuidados especiais a serem tomados pelo administrador do produto: Evitar o consumo humano deste medicamento, caso o mesmo ocorra, procurar orientação médica, levando consigo a embalagem do produto. O Praziquantel não sensibiliza a pele ou causa irritação, porém o contato com a pele e mucosas deve ser evitado, e caso isso ocorra, lavar o local imediatamente com água.

Apresentação: Cartuchos com blister contendo 4 comprimidos de 400 mg
Cartuchos com blister contendo 4 comprimidos de 800 mg
Cartuchos com blister contendo 4 comprimidos de 1200 mg

MODO DE CONSERVAÇÃO:

Conservar à temperatura ambiente (15°C a 30°C), em local seco e ao abrigo da luz solar direta.

MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO. PROIBIDO PARA USO HUMANO.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob o n° 9.015 em 28/12/2004

Responsável Técnico: Dra. Vera de Fátima Costa Calixto - CRF/SP n° 11.427

Proprietário e Fabricante:

Syntec do Brasil Ltda.
Estrada Rosa Scarpa, 178 - Votuparim
Santana de Parnaíba/SP - CEP 06513-010
CNPJ: 02.177.011/0001-77
Indústria Brasileira