

DIAZIPRIM® Oral

sulfadiazina + trimetoprima

Suspensão oral - Antimicrobiano

Uso Veterinário

Suspensão pronta para uso em cães e gatos.

FÓRMULA:

Cada 100 mL contém:

Sulfadiazina 20 g

Trimetoprima4 g

Veículo q.s.p.....100 mL

INDICAÇÕES:

DIAZIPRIM® Oral é uma associação terapêutica para uso oral, indicado no tratamento das infecções bacterianas em caninos e felinos nos seguintes casos:

- Infecções respiratórias, tais como pneumonias, broncopneumonias, bronquites, rinites e sinusites causadas por *Haemophilus spp.*, *Pasteurella spp.*, *Salmonella spp.*, *Escherichia coli*, *Streptococcus spp.*, *Staphylococcus spp.* e *Bordetella spp.*

- Infecções digestivas, tais como colibacilose causada por *Escherichia coli*, salmonelose causada por *Salmonella spp.*, pasteurelose causada por *Pasteurella spp.*, disenterias causadas por *Clostridium spp.* e *Shigella spp.*

- Infecções genitourinárias, tais como metrite pós-parto, uretrites, pielonefrites e cistites causadas por *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Escherichia coli* e *Proteus spp.*

- Mastites causadas por *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.* e *Escherichia coli*.

- Septicemias e abscessos causados por *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Escherichia coli* e *Salmonella spp.*

- Infecções pós-cirúrgicas causadas por *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.* e outros agentes susceptíveis, a critério do médico veterinário, inclusive como preventivo.

POSOLOGIA E MODO DE USAR:

Agite antes de usar. Administrar **DIAZIPRIM® Oral** na dose de 1 mL da suspensão para cada 8 Kg de peso corporal, a cada 24 horas, durante 5 dias consecutivos, ou seja, 25 mg de sulfadiazina e 5 mg de trimetoprima por Kg de peso (30 mg de princípios ativos/Kg de peso), conforme tabela abaixo. A dose pode ser administrada pura, diretamente na boca, ou misturada à água ou alimentos, desde que seja para consumo imediato. Nunca guarde a mistura para uso posterior.

Peso Corporal	Dose diária recomendada
2 Kg	0,25 mL
4 Kg	0,5 mL
8 Kg	1,0 mL
16 Kg	2,0 mL
20 Kg	2,5 mL
32 Kg	4,0 mL
Acima de 32 Kg	1,0 mL para cada 8 Kg de peso

A critério do médico veterinário, a dosagem pode ser aumentada até 50 mg de princípios ativos/Kg.

CONTRAINDICAÇÕES:

O produto é contraindicado para animais com grave insuficiência renal, com edema pulmonar, bem como deficientes em folato.

PRECAUÇÕES:

Não administrar o produto em animais hipersensíveis aos componentes da fórmula.

EFEITOS ADVERSOS:

Altas doses de sulfá podem desencadear um quadro agudo de intoxicação provocando diarreia, excitação, hiperpneia, fraqueza muscular, aumento da salivação e ataxia. O uso prolongado de sulfas pode causar diminuição da micção e dor, hematúria e cristalúria.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:

A associação de trimetoprima e sulfas promove efeito sinérgico bactericida, aumentando a ação de sulfas. Além disso, esta associação demonstra menor incidência de resistência bacteriana e efeito altamente bactericida. Não administrar o produto concomitantemente com anticoagulantes (warfarina) e derivados do PABA (ex.: procaína).

APRESENTAÇÃO:

Frascos-ampola de vidro âmbar com 20 e 50 mL de suspensão oral, acompanhado de seringa dosadora.

MODO DE CONSERVAÇÃO:

Conservar à temperatura ambiente (15°C a 30°C), em local seco e ao abrigo da luz solar direta.

MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E USO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob o nº 7.860 em 24/07/2001.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Dra. Vera de Fátima Costa Calixto - CRF/SP nº 11.427

PROPRIETÁRIO E FABRICANTE:

Syntec do Brasil Ltda.

Estrada Rosa Scarpa, nº.178

Votuparim – Santana de Parnaíba – SP

CEP: 06513-010

CNPJ: 02.177.011/0001-77

Indústria Brasileira



(11) 4702-5425
sac@syntec.com.br
www.syntec.com.br

